



POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Bulletin Technique n° 23 du 10 juillet 2001 - 2 pages - Numéro ordre postal : 49

P23

## Produits homologués sur les pucerons du maïs :

### TRAIT. PUCERONS (A LA FLORAIISON)

COMPOSITION	SPECIALITE	DOSE
pyrimicarbe	PICADOR G	0.4 KG/HA
	PIRIMEX 50% WG	0.4 KG/HA
	PIRIMOR G	0.4 KG/HA
deltamethrine et pyrimicarbe	BEST	1.5 L/HA
	JUSAN CL	1.5 L/HA
	STATUS	1.5 L/HA

### TRAIT. PUCERONS (AVANT FLORAIISON)

COMPOSITION	SPECIALITE	DOSE
bifenthrine	BISTAR	0.375 L/HA
	TALSTAR	0.3 L/HA
	TALSTAR FLO	0.375 L/HA
dicofol	KELTANE 4F	1.5 L/HA
	KELTHANE AP	4 KG/HA
	KELTHANE EC	4 L/HA
	KELTHANE MF	1.5 L/HA
	KELTHANE RHODIA	4 L/HA
	KELTHANE W 35	2 KG/HA
lambda cyhalothrine	EURO-APPRO I-5	0.15 L/HA
	KARACHOC	0.15 L/HA
	KARATE AVEC	0.075 L/HA
	TECHNOLOGIE ZEON	
	KARATE VERT	0.15 L/HA
	KARATE XPRESS	0.15 KG/HA
	KUNG-FU	0.15 L/HA
	LAMBDA C	0.15 L/HA
pyrimicarbe	PICADOR G	0.4 KG/HA
	PIRIMEX 50% WG	0.4 KG/HA
	PIRIMOR G	0.4 KG/HA
deltamethrine et pyrimicarbe	BEST	1.5 L/HA
	JUSAN CL	1.5 L/HA
	STATUS	1.5 L/HA
lambda cyhalothrine et pyrimicarbe	KARATE K	1.25 L/HA
	OKAPI GF OPEN	0.375 KG/HA 1.25 L/HA

## Féverole

STADES : remplissage des gousses

## Maladies

On constate, depuis une semaine et ce dans toute les régions d'Ile de France, des féveroles ayant des dessèchements de tiges, des feuilles qui fanent accompagnés d'un système racinaire nécrosé, noirâtre. Deux hypothèses sont avancées quant à l'origine de ces symptômes : Fusarium solani ou Pythium. Des analyses en laboratoire sont en cours afin d'identifier les champignons responsables de ces problèmes phytosanitaires.

D'autre part, on peut également observer des gousses remplies ou non de couleur noires. Là aussi l'identification est en cours dans nos laboratoires.

## Betteraves

STADES : 90 -100% de couverture du sol

## Ravageurs

### Pucerons :

Le stade couverture du sol est très souvent atteint. Fin du risque pucerons.

Pour les parcelles n'ayant pas encore atteint le stade couverture totale du sol, maintenir la protection. Pas plus de 10-12 jours entre 2 applications et alterner les produits.

### Noctuelles :

Les chenilles vertes de noctuelles ont été observées à Chambry (77) avec 3 noctuelles sur 10 pieds.

**Surveillez attentivement vos parcelles. Intervenez en cas de présence de nombreuses chenilles et le soir de préférence (activité nocturne).**